

Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES**

**RÉGION
RHÔNE-ALPES**



ABONNEMENT ANNUEL : 125 F
RÉGISSEUR RECETTES D.R.A.F.

78.63.25.65

165, rue Garibaldi - Bât. B- B.P. 3202 - 69401 LYON CEDEX 03

29 Mars 1988

N° de série continue 352

Bulletin n° 6

ARBRES FRUITIERS


Tavelures du pommier et du poirier : débutez la protection
Oïdium du pommier : intervenez dès à présent
Monilia des fleurs sur pêchers et abricotiers : protégez les fleurs
jusqu'à la chute des pétales

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Des projections d'ascospores ont été observées en laboratoire, aussi intervenez dès que les arbres atteignent le stade sensible (apparition des organes verts).


Rappel des stades sensibles

Pommier



Gonflement apparent

Poirier



Apparition des boutons floraux

Dans le sud de la Drôme et de l'Ardèche, la protection a dû débuter aux alentours du 22 Mars.

Pour les secteurs suivants : nord de la Drôme et de l'Ardèche, Isère, Loire, Ain et Rhône, un premier traitement devra être effectué dès la réception de ce Bulletin.

Savoie et Hte-Savoie : intervenez en fin de cette semaine.

Sur poiriers : le cuivre peut être utilisé jusqu'au stade E.


Sur pommiers : débutez la protection avec des produits de contact. Les traitements devront être renouvelés tous les 7 jours ou plus tôt dès que les pluies cumulées atteignent 25 mm.

Utilisation des produits pénétrants ou systémiques et associations (pénétrants + contacts) (cf tableau)

Limitez leur utilisation à 3 ou 4 applications en moyenne par campagne, en raison des risques de résistance.

P.1605

Positionnement d'un produit curatif (lutte curative) entre deux produits de contact (lutte préventive)



▲ jour du traitement

Remarque :

La durée d'action préventive ou curative varie selon le fongicide utilisé (cf tableau).

OIDIUM DU POMMIER

Profitez de l'intervention contre la tavelure pour ajouter un produit anti-oïdium.

Produits utilisables :

binapacryl	: 50 g de ma/hl	AMBOX 50
bupirimate	: 50 g de ma/hl	NIMROD
pyrazophos	: 30 g de ma/hl	AFUGAN CE
triadiméfon	: 5 g de ma/hl	BAYLETON 5

Ce produit étant un inhibiteur de la biosynthèse de l'ergostérol, limitez son utilisation à 3 ou 4 applications en moyenne par campagne.

CECIDOMYIES DES POIRETTES



D



D3

Apparition des boutons floraux.

Les adultes pondent dans les boutons floraux encore fermés et les larves se développent dans les jeunes fruits.

Intervenez dès le stade D3 avec l'un des produits suivants :

. diéthion	100 g de ma/hl	RHODOCIDE
. lindane	20 g de ma/hl	Nombreuses spécialités
. phosalone	60 g de ma/hl	ZOLONE, AZOPHENE

CECIDOMYIES DES FEUILLES



E



E2

Les sépales laissent voir les pétales.

Les piqûres de ponte provoquent l'enroulement des feuilles. Dans les vergers où des dégâts importants ont été constatés, intervenez avant la floraison (stade E2) avec une spécialité à base d'endosulfan.

CLOQUE DU PECHER

Sur de nombreuses variétés, les premières feuilles étalées sont visibles ; si des dégâts sont observés sur ces feuilles (déformations foliaires), maintenez une protection à base de thirame (200 g de ma/hl).

MONILIA DES FLEURS SUR PECHERS ET ABRICOTIERS

Actuellement, les fleurs de pêchers et d'abricotiers sont très sensibles au monilia, et la pluviométrie de ces derniers jours favorisent la dissémination des spores.

Les applications fongicides appliquées dans la semaine du 21 mars au 25 mars seront renouvelées dès le 1er Avril.

Produits utilisables :

* Groupe des benzimidazoles

bénomyl : 30 g de ma/hl BENLATE

thiophanate méthyl : 70 g de ma/hl PELT

carbendazime : 30 g de ma/hl (nombreuses spécialités)

Attention, afin d'éviter le phénomène d'accoutumance, ne pas multiplier les traitements aux benzimidazoles.

* Autres fongicides

bitertanol 30 g de ma/hl

BAYCOR 300 EC

iprodione 75 g de ma/hl

KIDAN - ROVRAL

procymidone 75 g de ma/hl

SUMISCLEX

triadiménol 10 g de ma/hl

BAYTAN 5 liquide - ne pas utiliser sur pêchers

triforine 33,5 g de ma/hl

SAPROL - DENARIN - FUNGINEX

vinchlozoline 50 g de ma/hl

RONILAN

TOUS ARBRES FRUITIERS

ACARIENS

Utilisation de l'Apollo : ce produit ovicide devra être appliqué en début de semaine prochaine (3 Avril) dans le Sud de la Drôme et de l'Ardèche.

Pour les autres situations, attendre un prochain avis.

Les produits de traitements anti-tavelures

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose de spécialité par hectare (1000 l/ha)	Délai d'utilisation « stop » ou « curatif » à partir du début de la pluie contaminatrice	Durée d'action préventive (en jours)	Autorisation sur oïdium du pommier	Action secondaire vis-à-vis de la rugosité sur Golden
------------------	--------------------------	--	--	--------------------------------------	------------------------------------	---

PRODUITS DE CONTACT (TRAITEMENT PRÉVENTIF OU STOP)

Par rapport à un témoin non traité

<i>captane</i>	Nombreuses spécialités	1500 g m.a.	24 heures	7	—	Freine parfois
<i>cuivre</i>	Nombreuses spécialités	2500 g m.a.	•	7	—	Favorise
<i>folpel</i>	Nombreuses spécialités	2 kg	24 heures	7	—	•
<i>mancozèbe</i>	Nombreuses spécialités	2 kg ou 3,5 l	24 heures	7	—	Neutre
<i>manèbe</i>	Nombreuses spécialités	2 kg	24 heures	7	—	•
<i>oxyquinoléate de cuivre</i>	Quinolate 400	2 l	•	7	—	•
<i>propinèbe</i>	Antracol	3 kg	24 heures	7	—	•
<i>soufre micronisé</i>	Nombreuses spécialités	7,5 kg ou 8 l	•	4 à 5	oui	Freine
<i>thirame</i>	Nombreuses spécialités	2,5 kg	24 heures	7	—	Freine parfois
<i>zinèbe</i>	Nombreuses spécialités	2,5 kg ou 3 kg	24 heures	4 à 5	—	Neutre
<i>zirame</i>	Nombreuses spécialités	1800 g m.a.	24 heures	4 à 5	—	Renseignements contradictoires
<i>dithianon</i>	Nombreuses spécialités	375 g m.a.	32 heures	7	—	•
<i>doguadine</i>	Melprex	0,75 kg	36 heures	7	—	Favorise parfois
<i>tolylfluanide</i>	Méthyleuparène	1,5 kg	48 heures	7	—	•

PRODUITS A BASE D'INHIBITEURS DE STÉROLS, PÉNÉTRANTS OU SYSTÉMIQUES ET ASSOCIATIONS PÉNÉTRANTS + CONTACTS (TRAITEMENT PRÉVENTIF, STOP OU CURATIF)

Par rapport au captane

<i>triforine</i>	Denarin*, Funginex*, Saprol*	2 l	3 jours	3	oui	Favorise parfois
<i>bitertanol</i>	Baycor 25	0,75 kg	4 jours	3	—	Favorise parfois
<i>fénarimol</i>	Rubigan 4*	1 l	4 jours	3	oui	Favorise parfois
<i>flusilazol</i>	Nustar 40 EC	0,05 l	5 jours	4	oui	Favorise parfois
<i>fénarimol + mancozèbe + captane</i>	Erisan Super*	2 kg	4 jours	3	—	Neutre
<i>nuarimol + captane</i>	Prévalan*	1 kg	4 jours	3	—	Neutre
<i>nuarimol + mancozèbe</i>	Sporlan, Spontal	2 kg	4 jours	3	—	Neutre
<i>penconazole + captane</i>	Topaze C*	1 kg	4 jours	3	oui	Neutre
<i>pyrifénol + captane</i>	Rondo*	1 kg	5 jours	3	oui	Neutre

m.a. matière active

• manque de références

* spécialité commerciale non autorisée ou non recommandée contre la tavelure du poirier

Remarques :

- en conditions difficiles (fort inoculum, températures élevées) réduire d'un jour les durées d'utilisation en curatif
- les nombreuses associations entre produits de contact n'ont pas été incluses dans ce tableau